idrobiochem®
concimi speciali

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SOIL CONDITIONER



RIZOHUMIC

Attivatore dell'assorbimento radicale a base di estratti umici da Leonardite Americana con pH acido

Natura BIO OK | PRODOTTO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

APPLICAZIONE RADICALE E FOGLIARE

Confezioni:
1 - 5 - 10 - 20 - 1100 kg

Vantaggi fisiologici

- **Favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi apportati in precedenza nel terreno**
- **Rivitalizza la flora batterica del suolo**
- **Favorisce l'attecchimento radicale**

Componenti

Estratti umici da Leonardite americana al 22% di concentrazione con pH acido

Formulazione: Ls

pH: 4,2 - 4,8 **Ps:** 1,1 kg/l

Classificazione: Nessuna

Registr. Sian Biologico Naz.: n.0025148/19

Caratteristiche

Rizohumic è un fitostimolante ad alta concentrazione di acidi umici con pH acido, esso facilita l'assorbimento dei nutrienti minerali gia presenti nel terreno, e promuove la crescita dell'apparto radicale nel post-trapianto nella fase di attecchimento. Il prodotto puo essere utilizzato anche per via fogliare alla dose minima.

Usi e dosi d'impiego

Colture	Dosi applicazione radicale	Dosi applicazione fogliare	Epoca d'impiego e frequenza
Agrumi, pesco, albicocco, prugno, ciliegio, melo, pero, kiwi, uva da tavola, uva da vino, frutti di bosco, olivo da mensa e da olio	1 - 2 kg/1000 mq per ogni applicazione	150 - 200 g/hl per ogni applicazione	Eseguire le applicazioni nelle varie fasi fenologiche: post-attecchimento, per le giovani piante. Mentre per le piante già messe a dimora, possono essere eseguite dal risveglio vegetativo alla maturazione
Pomodori, melanzane, peperoni, cetriolo, anguria, melone, zucchino, asparagi, crucifere, indivie, lattuga, cipolla, aglio, sedano, fragola e carciofo	0,400 - 1 kg/1000 mq per ogni applicazione	150 - 200 g/hl per ogni applicazione	Eseguire diverse applicazioni durante l'intero ciclo della coltura
Frumento e mais	----------	150 g/hl	Eseguire 1 applicazione
Colture serricole , forestali ed ornamentali	0,500 - 1,5 kg/1000 mq per ogni applicazione	250 - 300 g/hl per ogni applicazione	Eseguire 1-2 applicazioni

Avvertenze d'impiego

Il prodotto può essere utilizzato da solo o in miscela con i fertirriganti NPK.